

Radiados por oposición



Se consigue partiendo de un ligamento simple o de un motivo determinado, al que se le dibuja cuatro veces modificándolo a partir de la oposición de los tomos y dejes.


Radiados por oposición (Ligamentos compuestos)

Los radiados por oposición son ligamentos cuadrados. Se obtienen a partir de motivos también cuadrados que se hacen girar en torno a un punto de giro imaginario, por lo que en cada giro el ligamento ha hecho la oposición total de dejes y tomos. Es decir, lo que antes eran tomos, después del giro son dejes y viceversa.




Ejemplo:

A partir del motivo...



haciéndolo girar en torno a su ángulo superior derecho y con oposición total de los tomos y los dejos, se obtiene el ligamento radiado siguiente:






Enunciado general:

Normalmente, no tienen un enunciado general y solamente se da el curso en formato dibujo.

Características del ligamento:

Otros ejemplos de ligamentos radiados son:



Este último ligamento recibe el nombre de falsa gasa de vuelta, por la similitud a la gasa de vuelta que queda en los tejidos resultantes.

Entrat el 28 de febrer de 2024 per [Albert Pérez Monfort](#)

Autor: [Albert Pérez Monfort](#)

Traducció per: [Albert Pérez Monfort](#)